

# QUADRO DE VACINAÇÃO EM CÃES

<b>60 dias de idade</b>	<b>Vacina Octupla - 1ª dose</b>
<b>90 dias de idade</b>	<b>Vacina Octupla - 2ª dose</b>
<b>120 dias de idade</b>	<b>Vacina Octupla - 3ª dose</b>
<b>1 semana após a aplicação da 3ª dose da Octupla</b>	<b>Vacina Anti-Rábica</b>

OBS: O reforço das vacinas octupla e Anti-rábica deve ser anual.

Veja a seguir as doenças, que são evitadas com a vacinação, e os seus sintomas. Ao menor sinal leve o seu cão a um Médico veterinário, somente ele é capaz de avaliar, diagnosticar e tratar uma doença.

**CINOMOSE:** Enfermidade infectocontagiosa aguda, sub-aguda ou crônica; febril, particular da família canina entre os animais domésticos. Somente o cão. Sua transmissão se dá por vias respiratórias e digestivas. Na fase aguda o vírus é eliminado intensamente e em abundância pela secreção ocular, urina e fezes.

Manifestação:

- 1º. fase - digestiva: em que o animal apresenta vômitos, diarreia, mucosa sanguinolenta, anorexia, temperatura acima de 40°C.
- 2º. fase - respiratória: Broncopneumonia intensa, secreções mucosas e senomucosas, que depois passam para purulentas, geralmente por infecções secundárias.
- 3º. fase - nervosa: Nesta fase aparecem alterações mioclonais ( tic nervoso ), podendo encontrar as três fases ou apenas uma delas. A mais perigosa é a nervosa. Toda vez que suspeitar de cinomose ou leptospirose, a temperatura deverá estar acima de 40 °C.

**HEPATITE:** Enfermidade infectocontagiosa aguda, causada por vírus resistente ao éter, álcool, clorofórmio e sensível ao formol e calor. Período de incubação: 4 a 9 dias.

Manifestação:

- Animais jovens: morte súbita sem nenhum sinal clínico.
- Primeiro sinal: hipertemia passageira de 24 a 48 horas, temperatura de 40° a 40,5°, caindo logo após; apresenta sede intensa, anorexia, congestão das amígdalas, congestão das mucosas e da faringe, congestão conjuntival (pálpebras vermelhas), congestão da conjutiva nasal e bucal, fotofobia, hemorragias bucais, esquimoses na pele ( pinta ou pontos vermelhos). Principalmente na frente (abdômen) e faces internas da coxa e mucosa peniana, dispnéia (dificuldade respiratória) por edema pulmonar (pulmão cheio de líquidos), animais adotam posição de sentar, para aliviar a pressão.
- **LEPTOSPIROSE:** Doença infecciosa grave que atinge os homens e os animais, sendo causada por uma bactéria a *Leptospira* sp presente na urina dos ratos e camundongos. A contaminação se dá quando o animal, ou o indivíduo entra em contato com água ou lama que contenha a *Leptospira*. Esta penetra no organismo através de ferimentos na pele ou mesmo na pele íntegra quando num contato mais prolongado e também pelas mucosas (boca - nariz - olhos - órgãos genitais ).

Manifestação:

- Vômitos e diarreia as vezes com sangue, urina com sangue, icterícia.

**PARAINFLUENZA:** Tosse persistente, e as vezes associado a pneumonia. Esta doença é chamada tosse de canis.

**PARVOVIROSE:** Doença de cães seria e altamente contagiosa, e a infecção se dá pelo Parvovirus Canino que tem um curto período de incubação.

Manifestação:

- Os sintomas mais comuns são de morte súbita quando tivermos o modo cardíaco, com depressão e disfunções respiratórias. Vômitos, diarreias e desidratações são os sintomas do modo gastrointestinal que tem como sinal principal fezes sanguinolentas.

**CORONAVIROSE:** Doença viral, com um quadro semelhante à Parvovirose.

**RAIVA:** Doença infecto contagiosa aguda e fatal, caracterizada por sinais nervosos, apresentados por agressividade e por semi-paralisia ou paralisia. Tempo de incubação: pode aparecer de 10 a 90 dias.

